

# Webinar: weidevogelbeheer



Astrid Manhoudt

Dinsdag 19 mei 2020: 14 – 17 uur

## Greener Future for Young Farmers

# Inhoud van mijn presentatie:



- Kort wat heeft de weidevogel nodig?
- Wat is goed beheer voor de weidevogel?
- Wat zijn de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw?



# Voedsel voor de volwassen weidevogel

**Tabel 1.1 Voedsel van de volwassen steltlopers**


| Vogelsoort  | Ondergronds | Bovengronds | Overig# |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| Grutto      | ***         | *           | *       |
| Kieviet     | **          | **          | *       |
| Kemphaan    | *           | **          | *       |
| Tureluur    | *           | *           | **      |
| Watersnip   | *           | *           | **      |
| Wulp        | ***         | *           | *       |
| Scholekster | ***         | *           | *       |

\*\*\* = > 75% van het voedsel

\*\* = 25 - 50% van het voedsel

\* = < 25 % van het voedsel.

Bron: van der Weijden en Guldemand, 2006



# Verschillende soorten, verschillende tijden...

| Soort       |           | feb | maart                      | april |          | mei                      |                                | juni |  | juli |  |
|-------------|-----------|-----|----------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------------------------|------|--|------|--|
| Kievit      | vestiging |     | kort nat gras + mais       |       |          |                          |                                |      |  |      |  |
|             | broeden   |     | 26 dagen                   |       |          |                          |                                |      |  |      |  |
|             | kuiken    |     |                            |       |          | na 35-40 dagen vliegvlug |                                |      |  |      |  |
|             | trek prep |     |                            |       |          |                          |                                |      |  |      |  |
| Grutto      | vestiging |     | nat structuurrijk grasland |       |          |                          |                                |      |  |      |  |
|             | broeden   |     |                            |       | 25 dagen |                          |                                |      |  |      |  |
|             | kuiken    |     |                            |       |          | na 28-30 dagen vliegvlug |                                |      |  |      |  |
|             | trek prep |     |                            |       |          |                          |                                |      |  |      |  |
| Scholekster | vestiging |     | kort (begrasd) + bouwland  |       |          |                          |                                |      |  |      |  |
|             | broeden   |     |                            |       |          | 24-27 dagen              |                                |      |  |      |  |
|             | kuiken    |     |                            |       |          |                          | 20 dg gevoerd, +8 dg vliegvlug |      |  |      |  |
|             | trek prep |     |                            |       |          |                          |                                |      |  |      |  |


# Plas dras of hoog waterpeil



Foto T. Visser 2017

Foto Arend Sonneveld

# Kruidenrijk grasland



# Kuikenvelden + graslanden met rustperioden



# Weidevogelmozaïek in het ANLb




# Uitgangspunten weidevogelmozaïek

- Openheid
- Groot aaneengesloten gebied van minimaal 1000 ha
- Een kern van 200 ha met:
  - Kruidenrijk grasland
  - Plas dras / greppel plasdras
  - Hoog waterpeil



# Waarom natuurinclusieve landbouw inzetten?

Nesten en broedparen vier hoofdsoorten binnen en buiten ANLb  
seizoen 2019, It Lege Midden



# Waar kan de boer mee beginnen?

- Slootkanten later maaien
  - Minder/geen mest op randen of delen van percelen
  - Natte of minder productieve percelen nat laten
  - Een greppel dicht zetten in het voorjaar
- 
- Monitoren waar de vogels zitten
  - Rekening houden met de vogels bij het maaien

# Meerwaarde – maatregelen 1

Kruidenrijk grassland:

- voldvelds / randen als verbindingzones in combinatie met
  - Watermaatregelen
  - Ruige mest

Voor de koeien: structuurrijk gras / mineralen en sporenelementen

Voor de weidevogels: dekking en voedselaanbod



# Meerwaarde – maatregelen 2

Vorbeweiden of beweiden

- Verschillende dichtheden
- Mest in de wei

Voor de weidevogels:

- Grotere variatie in structuur
- Meer dekking
- Groter voedselaanbod



Foto KTC Zegveld

# Aangepast maaibeheer

- Vogels + kuikens vooraf verjagen
- Van binnen naar buiten maaien
- Alleen overdag maaien
- Met lage snelheid

Monitoring nodig:

➤ weet waar de vogels zitten



